

ALGORITMO DE MANEJO EN PACIENTES CON SOSPECHA DE COLÉDOCOLITIASIS

Paciente con dolor abdominal epigástrico o en hipocondrio derecho + ictericia.

Solicitar perfil hepático (Bilirrubinas, AST-ALT, fosfatasa alcalina y amilasa) + Eco hepatobiliar

Criterios de ALTO riesgo para Colédocolitiasis

CPRE

Criterios de MODERADO riesgo para Colédocolitiasis

Colangio RMN

Reporte de Colédocolitiasis

NO

Buscar diagnósticos diferenciales.

SI

CPRE o CRPRE + Colangioscopia en caso de colédocolitiasis difícil y gigante.

- CRITERIOS DE ALTO RIESGO:**
1. Litiasis del conducto biliar común en imagen.
 2. Bilirrubina total <4mg/dl y colédoco dilatado.
 3. Colangitis ascendente.

- CRITERIOS DE RIESGO MODERADO**
1. Prueba hepáticas anormales.
 2. Dilatación del colédoco.



Para la última que te mandé de colédocolitiasis, el link es este [Buxbaum, J. L., Fehmi, S. M. A., Sultan, S., Fishman, D. S., Qumseya, B. J., Cortessis, V. K., Schilperoort, H., Kysh, L., Matsuoka, L., Yachimski, P., Agrawal, D., Gurudu, S. R., Jamil, L. H., Jue, T. L., Khashab, M. A., Law, J. K., Lee, J. K., Naveed, M., Sawhney, M. S., ... Standards, A. \(n.d.\). ASGE guideline on the role of endoscopy in the evaluation and management of choledocholithiasis Prepared by: ASGE STANDARDS OF PRACTICE COMMITTEE. www.giejournal.org](#)