



Duración de la terapia antibiótica en la colecistitis y colangitis			
Infección biliar adquirida en la comunidad			Infección biliar asociada al cuidado de la salud
Severidad y diagnóstico	Colecistitis Grado I y II	Colangitis grado I y II Colangitis y colecistitis grado III	Colangitis y colecistitis Grado I, II y III asociado al cuidado de la salud
Duración de la terapia antibiótica	La terapia antibiótica puede ser descontinuada dentro de las 24 h posteriores a la realización de la colecistectomía.	Una vez controlada la fuente de infección, la duración debe ser de 4 a 7 días. Si la bacteriemia es por cocos grampositivos como <i>Enterococcus</i> spp., <i>Streptococcus</i> spp. la duración del tratamiento debe ser de mínimo 2 semanas.	Si la bacteriemia es por cocos grampositivos como <i>Enterococcus</i> spp., <i>Streptococcus</i> spp. la duración del tratamiento debe ser de mínimo 2 semanas.
Condiciones específicas para extender la terapia antibiótica	Si durante la cirugía, se observa Perforación, cambios enfisematosos y necrosis de la vesícula biliar. Se recomienda una duración de 4 a 7 días.	Si hay cálculos residuales u obstrucción del tracto biliar, el tratamiento debe continuar hasta que se resuelva la obstrucción. Si hay absceso hepático, el tratamiento debe continuar hasta que se produzca mejoría en síntomas clínicos, bioquímicos y seguimiento radiológico.	

